

ETAMCYNONE®

Etamsylate 250mg/2ml

Solution injectable I.V. / I.M.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Forme et Présentation:

ETAMCYNONE® 250 mg /2 ml, Solution injectable I.V. / I.M.

Usage hospitalier: Boite de 50 ampoules.

Usage officinal: Boite de 10 ampoules.

Composition:

Principe actif : Etamsylate 250 mg

Excipients : Métabisulfite de sodium; Edétate de sodium; Phénol; Eau pour préparation injectable, q.s.p. Une ampoule.

Excipients à effets notoires : Métabisulfite de sodium, Sodium.

Classe pharmaco-thérapeutique:

HEMOSTATIQUE SYSTEMIQUE

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un antihémorragique et un vasculoprotecteur.

Il est proposé:

- Dans le traitement des saignements par fragilité des petits vaisseaux sanguins.
- Dans le traitement des ménorragies.
- En cas d'intervention chirurgicale pour diminuer les pertes sanguines, en particulier hémorragies en nappe, malades sous anti-coagulants.

CONTRE INDICATIONS :

N'utilisez jamais ETAMCYNONE® 250 mg/2 ml, solution injectable en cas d'intolérance ou d'allergie à l'étamsylate et/ou à l'un des autres composants.

Ce médicament est **DECONSEILLE** en cas d'allaitement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI, MISES EN GARDE SPECIALES :

Faites attention avec ETAMCYNONE® 250 mg/2 ml, solution injectable.

Ce médicament contient des sulfites qui peuvent provoquer une réaction allergique généralisée.

En cas d'apparition d'une fièvre, le traitement doit être arrêté. Consultez immédiatement votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

Prévenir votre médecin en cas de grossesse.

Allaitement :

L'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES OU A UTILISER DES

MACHINES :

Sans objet.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Adultes :

- En urgence: 2 à 3 ampoules, trois fois par jour, en I.V. ou I.M.
- En pré-opératoire : 1 heure avant l'intervention, 2 ampoules I.V. ou I.M.
- En per-opératoire : à la demande.
- En post-opératoire : 1 ampoule I.V. ou I.M., 2 fois par jour.

Nourrissons et enfants : même schéma thérapeutique que chez l'adulte en réduisant la posologie de moitié.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration :

Voie injectable I.V. ou I.M..

Pour ouvrir l'ampoule : Tenir fermement l'ampoule, saisir la tête de l'ampoule entre le pouce et l'index puis exercer une pression vers l'arrière.

Durée du traitement :

Selon prescription médicale.

SURDOSAGE :

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ETAMCYNONE® 250mg / 2ml, solution injectable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- possibilité de fièvre, maux de tête, éruptions cutanées, nausées, vomissements, diarrhée.

- en raison de la présence de sulfites, risque de réactions allergiques, allant de l'éruption cutanée à une réaction allergique généralisée parfois sévère et pouvant s'accompagner d'une gêne respiratoire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITION DE CONSERVATION :

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

- Après ouverture, le produit doit être utilisé immédiatement.

Liste I

DATE DE REVISION DE LA NOTICE :

Avril 2019

FABRICANT/DETENTEUR DE LA D.E. :

Les Laboratoires FRATER-RAZES.

08, Site Oued el Kerma, Saoula - Alger

N° D.E. : 19/12H039/433

